

Anlage 5

Förderfähige Sorten im Sinne dieser Richtlinie für Maßnahme Nummer II. C 2.2 (Erhaltung regionaltypischer Kulturpflanzenarten und -sorten, die durch Generosion bedroht sind)

Lebensweise	Art	Form (Varietät/Phänotyp)	Eigenschaften	Belege	Beispiel für besonders geeignete Sorte	Kategorie
Winter-, 2-jährig	Gerste (Hordeum)	zweizeilige, bespelzt	langstrohig, winterfest	Literatur	Hohenfinower	HA
Winter-, 2-jährig	Gerste (Hordeum)	mehrzeilige, bespelzt	langstrohig, winterfest	Literatur	Berkners (syn. Bürckners, Bergers, u. a.) Schlesische Wintergerste	HA
Winter-, 2-jährig	Gerste (Hordeum)	mehrzeilige, bespelzt	langstrohig, winterfest	Literatur	Janetzkis Wintergerste	HA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Dickkopfformen und Squareheadabstammungen	kurzstrohig, kompaktährig	Literatur	Kuwerts ostpreußischer Dickkopfwizen, u. a.	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Dickkopfformen und Squareheadabstammungen	kurzstrohig, kompaktährig	Literatur	Lembkes Obotriten	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Dickkopfformen und Squareheadabstammungen	kurzstrohig, kompaktährig	Literatur	P.S.G. Pommerania	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Dickkopfformen und Squareheadabstammungen	kurzstrohig, kompaktährig	Literatur	Pommerscher Dickkopf (syn. Alter pommerscher Dickkopf)	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	begrannte/unbegrannte langährige, übw. weißkörnige Lutescens-Formen	langstrohig, winterhart, trockenheitsverträglich	Literatur	Ostpreußischer Eppweizen	RHA
Winter-, 2-jährig begrannt/unbegrannt	Weizen (Triticum)	langährige, übw. weißkörnige Lutescens-Formen	langstrohig, winterhart, trockenheitsverträglich	Literatur	Markovitzer Edelepp	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	begrannte/unbegrannte langährige, übw. weißkörnige Lutescens-Formen	langstrohig, winterhart, trockenheitsverträglich	Literatur	Edelepp	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	begrannte/unbegrannte langährige, übw. weißkörnige Lutescens-Formen	langstrohig, winterhart, trockenheitsverträglich	Literatur	Bielers Edelepp	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Criewener Nr. 104	HA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Criewener Nr. 27	HA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Criewener Nr. 192	HA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Märkischer Landweizen	RHA

Lebensweise	Art	Form (Varietät/Phänotyp)	Eigenschaften	Belege	Beispiel für besonders geeignete Sorte	Kategorie
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Sächsischer Landweizen	RHA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Ruppiner brauner Landweizen	RH
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Kläderner Altmärker Landweizen	RH
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Kujawischer Weizen	RH
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	regionale Landherkünfte und daraus entwickelte, regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Salzmünder Bartweizen	HA
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Hartweizen		Literatur	Heines Hartweizen	RH
Winter-, 2-jährig	Weizen (Triticum)	Binkelweizen, alle Formen, züchterisch unbehandelt		Literatur	alle Herkünfte	RA
Winter-, 2-jährig	Dinkel, Spelz	langstrohige, sehr locker- und langährige Formen, ohne Trit.aest.-Einkreuzung		Literatur	alle Herkünfte	RA
Winter-, 2-jährig	Rauweizen (Triticum turgidum)	langstrohige, großährige Formen		Literatur	Rivetts Grannen (syn. Rivetts bearded) u. a.	
Winter-, 2-jährig	Roggen (Secale)	langstrohig, winterfest		Literatur	Champagnerroggen (Jägers Norddeutscher, u. a.)	RHA
Winter-, 2-jährig	Roggen (Secale)	kurzstrohig(er), winterfest		Literatur	Mecklenburger Marienroggen (syn. Brandts Marien)	RHA
Winter-, 2-jährig	Roggen (Secale)	langstrohig, winterfest		Literatur	Heines Hellkorn	RHA
Winter-, 2-jährig	Roggen (Secale)	kurzstrohig(er), winterfest		Literatur	Petkuser Kurzstrohsorten: Kustro, Petkuser Kurzstroh	HA
Winter-, 2-jährig	Emmer (Tr.dicocum)	Landrassen ohne weitere züchterische Bearbeitung		Literatur	Schwarzer behaarter Winteremmer	RA
Winter-, 2-jährig	Emmer (Tr.dicocum)	Landrassen ohne weitere züchterische Bearbeitung		Literatur	Weißer Winteremmer	RA
Winter-, 2-jährig	Emmer (Tr.dicocum)	Landrassen ohne weitere züchterische Bearbeitung		Literatur	Roter Emmer	
Sommer-, 1-jährig	Gerste (Hordeum)	zweizeilig, bespelzt, begrannt, dichtährig (Hordeum dist. erectum)		Literatur	Dr. Francks Grannen-abwerfende Imperialgerste	RH

Lebensweise	Art	Form (Varietät/Phänotyp)	Eigenschaften	Belege	Beispiel für besonders geeignete Sorte	Kategorie
Sommer-, 1-jährig	Gerste (Hordeum)	zweizeilig, bespelzt, begrannt, dichtährig (Hordeum dist. erectum)		Literatur	Breustedts Harzer Imperial	RH
Sommer-, 1-jährig	Gerste (Hordeum)	zweizeilig, bespelzt, begrannt, dichtährig (dist. erectum)		Literatur	Heines Goldthorpe	RH
Sommer-, 1-jährig	Gerste (Hordeum)	zweizeilig, bespelzt, begrannt, lockerährig (Hordeum dist. nutans)		Literatur	Bernburger Mehltau- resistente (syn. Braunes Mehltauresistente), Heines Amsel	HA
Sommer-, 1-jährig	Gerste (Hordeum)	vielzeilige Sommer- gersten (Hordeum vulgare)		Literatur	Hohenfinower Vierzeilige	HA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohige, begrannete, oft farbkörnige und schmal lang/lockerährige Formen; ehem. in NO-Deutschland verbreitete Landherkünfte		Literatur	Galizischer Grannen	RHA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohige, begrannete, oft farbkörnige und schmal lang/lockerährige Formen; ehem. in NO-Deutschland verbreitete Landherkünfte		Literatur	Russischer Banater Grannen	RHA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohige, begrannete, oft farbkörnige und schmal lang/lockerährige Formen; regional angepasste Zuchtsorten		Literatur	Roter Schlanstedter (div. syn. Rimpaus, Strubes)	RHA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohig, unbegrannt, farbährig, frühe regionale Züchtung		Literatur	Postelberger Wechsel Stamm (syn.)	RHA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohige, dichtährige Formen, Zuchtherkünfte		Literatur	Bornebusch, Wahrber- ger, Bergers Hellgelber	RHA
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	langstrohige Sommer- dickkopfformen bzw. davon abgeleitete Zucht- sorten		Literatur	Dippes Bordeaux, Perlweizen	R
Sommer-, 1-jährig	Weizen (Triticum)	Binkel- und Igelweizen: kurzstrohig, kompakt- dichtährige Formen, meist kurz begrannt		Literatur	Igelweizen u. a. ähnliche Herkünfte	R
Sommer-, 1-jährig	Dinkel, Spelz (triticum spelta)	langstrohige, sehr locker- und langährige, gel. behaarte, farbgetonte Formen, ohne Trit.aest.- Einkreuzung		Literatur	blauer samtiger Dinkel, roter Sommerkolben, roter Kolbenspelz	R
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig		von Kalbens Vienauer Weißhafer	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Kleyhafer (syn. Lüne- burger Kley u.a.)	RH
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Heidegold	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Lischower Früh	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Fischers Wirchenblätter	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Streckenthiner	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, weiß	langstrohig	Literatur	Kirsches Pfiffelbacher	RHA

Lebensweise	Art	Form (Varietät/Phänotyp)	Eigenschaften	Belege	Beispiel für besonders geeignete Sorte	Kategorie
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, gelb	langstrohig	Literatur	P.S.G. Goldkorn	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, gelb	langstrohig	Literatur	Kirsches Gelbhafer	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, gelb	langstrohig	Literatur	Duppauer Hafer (syn.)	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, gelb	langstrohig	Literatur	Flämingsgold	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, gelb	langstrohig	Literatur	Flämingsstreu	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, braun	langstrohig	Literatur	N.N.	H
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, schwarz	langstrohig	Literatur	Rotenburger Schwarzhafer	RH
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Rispenhafer, schwarz	langstrohig	Literatur	Schwarzer Präsident	RH
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Fahnenhafer, schwarz	langstrohig	Literatur	Schwarzer tatarischer Fahnenhafer	RHA
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Fahnenhafer, gelb, weiß	langstrohig	Literatur	Sobotkaer Fahnenhafer	RH
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Sandhafer (Avena strigosa)	langstrohig	Literatur		RH
Sommer-, 1-jährig	Hafer (Avena)	Av. byzantina	langstrohig	Literatur	Mittelmeerhafer, versch. Herkünfte	RH
Sommer-, 1-jährig	Roggen (Secale)	Sec. cereale	langstrohig, trockenheitsangepasst	Literatur	Karlshulder Sommerroggen	RHA
Sommer-, 1-jährig	Roggen (Secale)	Sec. cereale	langstrohig, trockenheitsangepasst	Literatur	Petkuser	R
Sommer-, 1-jährig	Roggen (Secale)	Sec. cereale	langstrohig, trockenheitsangepasst	Literatur	Boris Perlerug	R
Sommer-, 1-jährig	Emmer (Triticum dicoccum)	Landrassen ohne weitere züchterische Bearbeitung		Literatur	Brauner Sommeremmer	RA
Sommer-, 1-jährig	Hirse (Panicum)			regionale Züchtung	Bernburger Rispenhirse	RH
Sommer-, 1-jährig	Mais (Zea mays)	nicht-hybride Populationsarten		regionale Züchtung	Petkuser, u. a.	RH
					Janetzki Körnermais	RH
					Mahndorfer	RH
					Schindelmeiser	RH
					Mecklenburger	RH
					Janetzki Astra	RH
mehrfährig, fakultativ Dauerkultur (vegetativ)	Krapp, Färberröte Rubia tinctorum L.	Auslesen aus div. Sammlungen	als Färbepflanze, gel. auch kleinflächig als Arzneipflanze Nachweise für Deutschland, insbes. Ostdeutschland	Literatur u.a. MANS-FELD-V.	keine Sorten, Herkünfte aus Versuchs-, Erhaltungsanbau, ex-situ-Sammlungen	RH
Winter-, 2-jährig	Resede, Wau, Färberwau, Gelbkraut Reseda luteola L.	Auslesen aus div. Sammlungen	als Färbepflanze, Heil- u. Ölpflanze für Europa, N-Europa bis S-Schweden nachgewiesen	Literatur u.a. MANS-FELD-V.	keine Sorten, Herkünfte aus Versuchs-, Erhaltungsanbau, ex-situ-Sammlungen	RH

R Rückgangstendenz von Art/Unterart bzw. Lebensform rechtfertigt Förderung (Generosionsstatus)

H historischer Beleg für den regionalen Anbau bzw. eine regionale züchterische Bearbeitung oder Züchtungsvorhaben (Literaturstelle)

A es besteht eine besondere Anpassung an Boden- bzw. Standortklimagegebenheiten, Ergebnisse aufgrund Vergleichsanbau